



IMM+4/CB COMBI – FEROMONE

FEROMONE COMBINATO PER LEPIDOTTERI E COLEOTTERI DELLE DERRATE

CARATTERISTICHE

IMM+4/CB COMBI è un innovativo dispositivo per il rilascio di feromoni multispecie, specifico per il controllo dei principali lepidotteri delle derrate (*Plodia* spp., *Ephestia* spp., *Cadra* spp.) e dell'Anobio del Tabacco (*Lasioderma serricorne*).

IMM+4/CB COMBI è costituito da una capsula in gomma intrisa di feromoni sessuali da utilizzare per il monitoraggio degli infestanti specifici.

IMM+4/CB COMBI una volta aperta ha una semivita di 60 giorni. Da maneggiare con guanti e non fumare durante la manipolazione per evitare di compromettere l'efficacia del prodotto.

DESTINAZIONE D'USO

IMM+4/CB COMBI viene impiegato per il monitoraggio, inserito nelle apposite postazioni di monitoraggio. Si utilizza in Industrie Alimentari (mulini, granai, caseifici, macelli, ecc.), magazzini e depositi di materie prime (cereali, farine, pasta, cioccolato, tabacco, frutta secca, farine, ecc.), vendita al dettaglio (GdO) ed esercizi di somministrazione alimenti (cucine, ristoranti, rivendite, ecc.).

IMM+4/CB COMBI ottempera alle metodiche di monitoraggio previste da HACCP e Integrated Pest Management (IPM).

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

IMM+4/CB COMBI deve essere conservata in luogo fresco e asciutto ($T < 25^{\circ}\text{C}$ – U.R. $< 55,0\%$).

IMM+4/CB COMBI in condizioni ottimali di stoccaggio presenta una durata sino a 3 anni.

SPECIFICHE INFESTANTE

Plodia Spp.

- Dimensione: 16 mm
- Colore: ruggine e grigio
- Ciclo biologico: 28-35 giorni
- Substrato preferito: polifaga
- Risponde ai raggi UV: sì
- Penetrazione imballaggi: sì, solo le larve



Cadra Spp.

- Dimensione: 14-20 mm
- Colore: grigio
- Ciclo biologico: 25-30 giorni
- Substrato preferito: frutta secca, cacao
- Risponde ai raggi UV: sì
- Penetrazione imballaggi: sì, solo le larve



Ephestia Spp.

- Dimensione: 10-15 mm
- Colore: grigio
- Ciclo biologico: 30-180 giorni
- Substrato preferito: farine e derrate di derivazione cerealicola
- Risponde ai raggi UV: sì
- Penetrazione imballaggi: sì, solo le larve



Lasioderma serricorne.

- Dimensione: 2-3 mm
- Colore: marrone
- Ciclo biologico: 40-70 giorni
- Substrato preferito: polifago
- Risponde ai raggi UV: sì
- Penetrazione imballaggi: no



CARATTERISTICHE FEROMONE

INFESTANTI TARGET

Lepidotteri

Tignola della frutta secca (*Cadra cautella*), Tignola dei fichi secchi (*Cadra figuliella*), Tignola del dattero (*Cadra calidella*), Tignola del cacao (*Ephestia elutella*), Tignola grigia della farina (*Ephestia kuehniella*), Tignola fasciata (*Plodia interpunctella*).

Coleotteri

Anobio del Tabacco (*Lasioderma serricorne*)

TIPOLOGIA DI FEROMONE

Feromone sessuale e attrattivo alimentare

PRODOTTI COLLEGATI

Storgard II
Thinline III – Quick Change
Transporter – Quick Change
Zebratrap
Zebratrap Moth
Bucket Trap

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda informativa di sicurezza.

Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.

La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.