IMM+4 – FEROMONE

FEROMONE PER LEPIDOTTERI DELLE DERRATE

TRAPPOLE A FEROMONI

Scheda Tecnica

Revisione 0 – Febbraio 2026

CARATTERISTICHE

IMM+4 è un dispositivo per il rilascio di feromoni specifico per lepidotteri delle derrate (*Plodia spp.; Ephestia spp.; Cadra spp.*;).

IMM+4 è integrato in un innovativo dispenser in CE/PVC, progettato per potenziare l'efficacia dell'attrattivo.

IMM+4 è da utilizzare all'interno delle trappole di monitoraggio adatte alla cattura dei lepidotteri

IMM+4 una volta aperta ha una semivita di 60 giorni. Da maneggiare con guanti e non fumare durante la manipolazione per evitare di compromettere l'efficacia del prodotto

DESTINAZIONE D'USO

IMM+4 può essere impiegato per monitoraggio, inserito nelle apposite trappole, in aree e locali di lavorazione degli alimenti: cucine (ristoranti e rivendite), caseifici, macelli, locali di vendita al dettaglio, impianti di confezionamento della carne, supermercati, ecc; aree di stoccaggio alimenti, magazzini alimentari e depositi di materie prime (farine, cereali, pane, pasta, cioccolato, tè, tabacco, frutta secca, ecc.), mulini, granai, ecc.

IMM+4 è indicato per il monitoraggio così come previsto da Normativa Cogente e Certificazioni volontarie.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

IMM+4 deve essere conservata in luogo fresco e asciutto (T < 25°C – U.R. < 55,0%)

IMM+4 in condizioni ottimali di stoccaggio presenta una durata sino a 3 anni

SPECIFICHE INFESTANTE

Plodia Spp.

- Dimensione: 16 mm
- Colore: ruggine e grigio
- Ciclo biologico: 28–35 giorni
- Substrato preferito: polifaga
- Risponde ai raggi UV: si
- Penetrazione imballaggi: si, solo le larve

Cadra Spp.

- Dimensione: 14–20 mm
- Colore: grigio
- Ciclo biologico: 25–30 giorni
- Substrato preferito: frutta secca, cacao
- Risponde ai raggi UV: si
- Penetrazione imballaggi: si, solo le larve

Ephestia Spp.

- Dimensione: 10–15 mm
- Colore: grigio
- Ciclo biologico: 30–180 giorni
- Substrato preferito: farine e derrate di derivazione cerealicola
- Risponde ai raggi UV: si
- Penetrazione imballaggi: si, solo le larve

CARATTERISTICHE FEROMONE

Infestanti target
Tignola della frutta secca (*Cadra cautella*), Tignola dei fichi secchi (*Cadra figuliella*), Tignola del dattero (*Cadra calidella*), Tignola del cacao (*Ephesthia elutella*), Tignola grigia della farina (*Ephestia küehniella*), Tignola fasciata (*Plodia interpunctella*).

Tipologia di feromone
Feromone sessuale

PRODOTTI COLLEGATI

Storgard II
Storgard II – Quick Change
Zebratrap
Zebratrap Moth
Bucket Trap

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda informativa di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.

Colkim more than chemistry