

CHABARIM

Insetticida in polvere pronto all'uso

INSETTICIDI



Scheda
Tecnica

Revisione 1 - Aprile 2025

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

Chabasite	70,0 g
Philipsite	2,0 g
K-feldspato (sanidino)	5,0 g
Biotite (illite)	2,0 g
Piroseno (augite)	3,0 g
Vetro vulcanico	18,0 g

CARATTERISTICHE

CHABARIM è un insetticida in polvere vulcanica a base di Cabasite, non pericolosa per l'essere umano. Questo minerale ha una struttura cristallina cubica ed esplica una duplice azione meccanica verso gli insetti: inalazione e contatto (lacerazione). Non causa fenomeni di resistenza ed è certificata per l'uso in Produzione Biologica (Reg. UE 2018/848). La Cabasite, inoltre, è registrata come corroborante in ambito agricolo (Decreto ministeriale n. 18354/2009) e utilizzata come materia prima per uso mangimistico nella zootecnia (Reg. CE 767/2009).

DESTINAZIONE D'USO

CHABARIM può essere utilizzato in:

- Aziende alimentari: locali di produzione e trasformazione alimenti, magazzini e depositi di sostanze alimentari, bar, ristoranti, ecc.
- Magazzini o aree dedicate allo stoccaggio di sementi: silos, magazzini, ecc.
- Aziende zootecniche, anche in presenza di animali: allevamenti, stabulari, ricoveri di animali, ecc.
- Ambienti civili e domestici: case, caserme, cinema, hotel, ecc.
- Aree verdi: alberature e cespugli

ISTRUZIONI PER L'USO E DOSI D'IMPIEGO

CHABARIM è efficace contro gli stadi larvali e adulti di insetti striscianti e volanti.

CHABARIM è utilizzabile secondo le modalità e le dosi previste di seguito:

- **Protezione e controllo dei lepidotteri e coleotteri delle derrate in Aziende Alimentari:** trattamento tramite impolveratori alla dose di 10 g/m²
- **Protezione e controllo dei lepidotteri e coleotteri nello stoccaggio dei cereali:**
 - Trattamento preventivo dei locali vuoti: trattamento tramite impolveratori alla dose di 80 g/m²
 - Trattamento preventivo cereali stoccati: da 7 a 10 kg per ogni tonnellata di cereali stoccati. Distribuire in modo uniforme sui cereali, legumi o sementi durante lo stoccaggio
 - Trattamento curativo dei cereali stoccati: trattamento tramite impolveratori alla dose di 10 kg per ogni tonnellata di cereali stoccati.
- **Protezione e controllo degli infestanti in aziende zootecniche e allevamenti avicoli:** trattamento tramite impolveratori alla dose di 50 g/m² in tutte le possibili zone infestate, comprese pastoie e lettiera
- **Protezione e controllo infestanti del verde urbano:** in diluizione e mediante irrorazione alla dose di 400 g ogni 100 litri di acqua per ettaro di terreno (su un ettaro si distribuiscono circa 1000 litri). Intervento da effettuare ogni 10-15 giorni
- **Protezione e controllo infestanti in ambienti civili e domestici:** trattamento tramite impolveratori alla dose di 10 g/m²

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Non disperdere il contenitore nell'ambiente.



INFESTANTI TARGET

COLEOTTERI DELLE DERRATE

Sitophilus spp., *Rhyzopertha dominica*, *Tribolium spp.*, *Oryzaephilus spp.*, *Lasioderma serricorne*, *Stegobium paniceum*, ecc.

LEPIDOTTERI DELLE DERRATE

Plodia interpunctella, *Ephestia kuehniella*, *Sitotroga cerealella*, *Nemapogon granella*

ARTROPODI

Dermanyssus gallinae, *Alphitobius diaperinus*, *Alphitobius laevigatus*

INSETTI DEL VERDE URBANO

Bactrocera oleae, *Halyomorpha halys*

INFESTANTI DOMESTICI

Cimex lectularis, *Lasius spp.*, ecc.

ATTREZZATURE CONSIGLIATE

Impolveratori
Pompe a bassa pressione