DISINFETTANTI

Scheda Tecnica

Revisione 0 - Giugno 2026

FUMISPORE HA

Disinfettante per la distruzione di funghi e batteri

PRESIDIO MEDICO – CHIRURGICO.
REGISTRAZIONE MINISTERO DELLA SANITÀ N.19949

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Acido glicolico	*4 g*
Coformulanti q.b. a	*100 g*

CARATTERISTICHE



FUMISPORE HA è un disinfettante per le superfici in polvere fumogena, viene diffuso a secco ed ha un provata Attività battericida, lieviticida e fungicida.

DESTINAZIONE D'USO

FUMISPORE HA è un disinfettante specifico per Batteri, Funghi, e lieviti. può essere utilizzato per il Trattamento di disinfezione per via aerea delle superfici, dei locali vuoti e delle attrezzature, da eseguire al termine dei cicli di produzione giornalieri o settimanali, oppure durante campagne di sanificazione in assenza di personale

DOSI D'IMPIEGO

Battericida e Fungicida alla dose di 1 g/m³ in polvere di Fumispore HA corrispondenti a 40 mg di acido idrossiacetico/m³.

Prima dell'utilizzo:
Chiudere qualsiasi fonte di gas infiammabili, Scollegare cellule fotoelettriche,
Siccome il prodotto genera fumo, i sistemi di rilevamento fumo devono essere adattati durante il funzionamento, Spegnere gli impianti di ventilazione, Coprire gli strumenti sensibili al fumo e gli strumenti analitici con sensori, Chiudere tutte le uscite del locale.

Durante l'utilizzo:
Scompattare la polvere, Posizionare le dosi su un supporto resistente alle alte temperature e lontane da materiali combustibili, Aprire la capsula, accendere la miccia ed uscire dal locale, Mantenere il locale chiuso.

Dopo l'utilizzo:
Segnalare il divieto di ingresso nelle aree trattate. L'azione biocida inizia dopo 4 ore di tempo di contatto. L'azione biocida è ottimale dopo 15 ore di tempo de contatto. Al termine dei trattamenti: Ventilare per rinnovare il 90% dell'atmosfera dell'ambiente (da 30 minuti a 1 ora)
Osservare un intervallo di almeno 24 ore tra due trattamenti successivi.

INFESTANTI TARGET

Funghi e batteri

Attività	Organismo testato	Tempo di contatto	Temperatura	Concentrazione
Battericida	*Enterococcus hirae*	15 ore	18-22°C	1g/m³
	Escherichia coli	15 ore	18-22°C	1g/m³
	Pseudomonas aeruginosa	15 ore	18-22°C	0,83g/m³
	Staphylococcus aureus	15 ore	18-22°C	1g/m³
	· *Enterococcus hirae,* · *Escherichia coli,* · *Pseudomonas aeruginosa,* · *Staphylococcus aureus,* · *Proteus hauseri*	15 ore	20°C	0,8g/m³
Fungicida	*Aspergillus niger*	15 ore	18-22°C	1g/m³



ATTENZIONE

Indicazioni di Pericolo (H):
H319: Provoca grave irritazione oculare.

INDICAZIONI D'AVVERTENZA

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso.
Leggere le informazioni inerenti il prodotto contenute nella relativa scheda di sicurezza.
Poiché la COLKIM non esercita alcun controllo sul modo d'impiego del prodotto, essa non si assume alcuna responsabilità in merito all'utilizzo dello stesso.
Il testo risulta conforme a quanto presente nell'etichetta del prodotto.
La presente è indicata per i PCO trained professional, agronomi, veterinari, biologi e laureati in discipline scientifiche in genere.