VectoBac® 12AS

PRODOTTO BIOCIDA (PT18) - AUTORIZZAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE N. IT/2017/00414/MRP
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

Composizione

Bacillus thuringiensis subsp. *israelensis*, sierotipo H-14, ceppo AM65-52	11,61 g
Coformulanti	q.b. a 100 g

Attività biologica: 1200 UNITÀ TOSSICHE INTERNAZIONALI (UTI) per milligrammo

Formulazione
Sospensione acquosa concentrata.

Infestanti bersaglio
VectoBac® 12AS agisce esclusivamente per ingestione contro la maggior parte delle larve di culicidi (zanzare) e simulidi. Esplica una azione insetticida selettiva.

Ambienti d'uso
Culicidi:
È indicato per il trattamento delle acque stagnanti in fossi, canali di irrigazione, bacini di drenaggio, acque di marea, lagune e paludi salmastre, acque di risaia, acque reflue, acquitrini e pozzanghere del sottobosco o da neve disciolta o travasi temporanei (inondazioni, irrigazioni). È indicato inoltre per il trattamento di vasche di raccolta dei liquami e di altri effluenti provenienti da allevamenti animali, caseifici.
Simulidi:
È possibile applicare il prodotto negli habitat di sviluppo larvale tipici di questi ditteri ematofagi, ossia fiumi, e corsi d'acqua fluenti.


Attrezzature
- Pompe manuali a bassa pressione, lancia-mitra, ugelli montati su braccio telescopico.

Dosi consigliate
Le quantità di acqua da utilizzare per l'applicazione del prodotto variano entro un intervallo da 50 a 900 litri/ettaro e sono in funzioni delle condizioni climatiche, nonché delle condizioni chimico-fisiche del focolaio larvale (Culicidi) e della portata del corso d'acqua (Simulidi).
Culicidi:
- 0,25 - 1,5 L/ha in caso di bassa infestazione e presenza di acque con scarso o modesto inquinamento
- 1,5 - 2,5 L/ha in caso di alta infestazione con predominanza di larve al 3° e 4° stadio di sviluppo e presenza di acque fortemente inquinate.

Simulidi:
I dosaggi sono in funzione delle caratteristiche del corso d'acqua (es. velocità, portata, torbidità e temperatura).
- 0,5 - 40 ppm/min - Impiegare la concentrazione maggiore quando il corso d'acqua contiene elevate concentrazioni di sostanze organiche e quando la vegetazione acquatica è molto densa.

Consigli di utilizzo
L'azione insetticida si manifesta rapidamente, di solito nell'arco di 4–24 ore.
Non superare le 8 applicazioni/anno ad intervalli di almeno 10 giorni fra una e l'altra.

INDIA
Impegno. Determinazione.
Benessere.



Note
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati in etichetta. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. Non miscelare con altri insetticidi e/o disinfettanti e/o detergenti. Conservare ben chiuso in un luogo sicuro, asciutto e ben ventilato. Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. In caso di irritazione, consultare un medico, tenendo a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.

INDIA è un brand di Indupharma S.r.l.
via Sorgaglia, 40 \ 35020 Arre (PD), Italy
tel. + 39 049 531 04 15 \ 39 049 807 61 44
info@indupharma.eu - www.indupharma.eu

Sfoglia il catalogo