MAGNUM GEL FORMICHE IGR

Prodotto Biocida (PT18) - Autorizzazione Ministero della Salute N. IT/2021/00774/MRP
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

Composizione
100 g di prodotto contengono:

Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3)	0,01%
S-Methoprene (CAS 65733-16-6)	0,08%
Bitrex® (Denatonium benzoato)	0,008%
Coformulanti	q.b. a 100%

Formulazione
Insetticida pronto all'uso (RTU) in formulazione gel, agisce per ingestione.
L'imidacloprid uccide le formiche adulte in 15 giorni, con un'efficienza superiore al 90%. L'S-metoprene può influenzare la vitalità delle larve attraverso la trofallassi, ossia la condivisione di cibo tra individui della stessa colonia. Agisce inoltre riducendo la fertilità della regina, nel caso in cui le operaie le trasferiscano l'esca.
Il prodotto contiene denatonium benzoato, sostanza estremamente amara che rende improbabile l'ingestione involontaria da parte delle persone.

Infestanti bersaglio
Magnum Gel Formiche IGR è efficace contro formiche adulte (*Linepithema humile*, *Lasius niger*).

Ambienti d'uso
Applicare MAGNUM GEL FORMICHE IGR in gocce o strisce dove si nota presenza di formiche, in prossimità del loro passaggio o vicino ai loro nidi. Si può utilizzare all'interno di edifici privati e commerciali, residenziali, industriali, pubblici, commerciali o istituzionali ed all'aperto su superficie pavimentate.

Attrezzature
- Pistola erogatrice
- Distributori di esca

Dosi consigliate e consigli di utilizzo
MAGNUM GEL FORMICHE IGR deve essere posizionato in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche.
Dose: 0,2–0,6 g/m² (corrispondenti a 1–3 gocce - 1 goccia è pari a una linea sottile di 3 cm di lunghezza). Il gel deve essere applicato nelle aree in cui le formiche sono presenti, in prossimità dei nidi, presso i loro percorsi o in crepe e fessure. Per utilizzo in esterni (terrazze, patii, cortili o giardini), il prodotto va applicato nelle aree di maggiore presenza delle formiche: davanzali, battiscopa, cornicioni e nei punti di entrata di cavi e tubature. L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche. Non contaminare il gel con insetticidi tradizionali, non applicare su superfici trattate con insetticidi tradizionali.

Indicazioni di pericolo
H411 Tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata.

INDIA
Impegno. Determinazione. Benessere.



BIOCIDA

Note
Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati in etichetta. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. Prima dell'uso, provare il prodotto su un'area ridotta della superficie da trattare. Non miscelare con altri insetticidi e/o disinfettanti e/o detergenti. Conservare ben chiuso in un luogo sicuro, asciutto e ben ventilato. Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. In caso di irritazione, consultare un medico, tenendo a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.

INDIA è un brand di Indupharma S.r.l.
via Sorgaglia, 40 \ 35020 Arre (PD), Italy
tel. + 39 049 531 04 15 \ 39 049 807 61 44
info@indupharma.eu - www.indupharma.eu

Sfoglia il catalogo