INSETTICI E ACARICIDI

# MICROTHRIN

INSETTICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA




Reg. N. 19494 - MICROTHRIN
TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE: Rea S.r.l. - S.S.87
Km 20,700 - 81025 Marcianise (CE)

PMC

## CARATTERISTICHE

Insetticida formulato in microemulsione acquosa che agisce per contatto e ingestione con azione abbattente ed elevata persistenza. L'assenza di solventi rende il prodotto inodore e non infiammabile. E' composto da Permetrina, piretroide fotostabile ad azione letale e da Tetrametrina, piretroide a spiccata azione abbattente e snidante, sinergizzati e protetti dalla degradazione enzimatica dal Piperonil Butossido.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti interni ed esterni sia pubblici, civili, che rurali e industriali: ospedali, scuole, industrie alimentari, alberghi, ristoranti, depositi. L'uso è anche previsto per trattamenti nelle aree verdi: viali alberati, cespugli e siepi, tappeti erbosi in quanto alle concentrazioni d'uso non risulta fitotossico.

## TARGET BERSAGLIO

Contro un vasto numero di insetti volanti tra cui mosche (m. domestica, moscone della carne, mosca cavallina), zanzare (genere Culex Pipiens, Aedes), flebotomi, vespe (*Vespula spp*) e striscianti tra cui blatte e striscianti tra cui blatte (*Blatta orientalis*, *Blattella germanica*, Periplaneta) e zecche (*Ixodes ricinus*).

## DOSI E MODALITÀ D'USO

Il prodotto è prontamente solubile e può essere impiegato utilizzando pompe a pressione, turbo atomizzatori e può essere impiegato utilizzando pompe a pressione, turbo atomizzatori e può essere impiegato utilizzando pompe a pressione, turbo atomizzatori e termonebbiogeni.
– Contro insetti volanti per trattamenti in interni: diluire 80-120 mL in 10 L di acqua (0.8-1.2 %).
La soluzione insetticida va nebulizzata nell'area ambiente in ragione di 1 L per 500 mc.
– Contro insetti striscianti per trattamenti in interni: diluire 150-200 mL in 10 L di acqua (1.5-2 %).
La soluzione insetticida va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 20 $m^2$.
– Trattamenti all'esterno: la soluzione insetticida va diluita in ragione di 400-800 mL in 100 L di acqua (0.4-0.8 %) utilizzando atomizzatori a medio-basso volume in ragione di 100 L per 10.000 $m^2$ di superficie.
– Trattamenti con apparecchi termonebbiogeni: utilizzare 100 mL di prodotto in 900 mL di glicole propilenico o idoneo solvente. La soluzione va impiegata mediamente per 3.500 mc.

## COMPOSIZIONE

Permetrina 93% min. (Cis/trans = 25/75): 16,13%
Tetrametrina 92% min.: 2,17%
Piperonilbutossido 94% min: 10,64%

## CODICI

FLACONE 1 L
q.tà 12 pz
TANICA 10 L
q.tà 1 pz

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22, 35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy
Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.