



RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS

Codice prodotto: 2538451AP

Categoria: Biocida

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di blocco paraffinato. USO PROFESSIONALE CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI FORMATI AREA DI UTILIZZO: ALL'INTERNO, ALL'ESTERNO INTORNO AGLI EDIFICI ED IN AREE APERTE

Registrazione Ministeriale:

IT/2012/00027/AUT

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Difenacoum (N°CAS 56073-07-5): 0,005g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6): 0,001g

Caratteristiche:

RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Difenacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS può essere usata all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, in giardini e in aree aperte all'esterno. **ORGANISMI TARGET** Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti, Ratto nero (*Rattus rattus*), sia giovani che adulti. **MODALITÀ APPLICATIVE** RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS è un'esca pronta all'uso in forma di pasta, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente. Aroma: fragola

Modalità d'impiego:

Utilizzare il prodotto conformemente ai dosaggi sotto riportati. Per l'applicazione in punti esca coperti e protetti, i punti esca

devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio. Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia. Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento. Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti. Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti. In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua. Non applicare il prodotto direttamente nelle tane. Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento se non utilizzato come esca permanente.

Uso all'interno di edifici per il controllo del Topolino Domestico, Ratto grigio e Ratto nero. Topolino Domestico: posizionare 40 g di RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Ratto grigio e Ratto nero: – in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. – In caso di bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS per contenitore, pari a 2-3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4-6 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.

Uso all'esterno, intorno agli edifici, per il controllo del Topolino Domestico, Ratto grigio e Ratto nero. Topolino Domestico: posizionare 40 g di RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Ratto grigio e Ratto nero: – in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. – In caso di bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS per contenitore, pari a 2-3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4-6 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.

Uso all'esterno, in aree aperte, per il controllo del Ratto grigio e Ratto nero. – in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. – In caso di bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS per contenitore, pari a 2-3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 4-6 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno.

Uso come esca permanente per il controllo del Topolino Domestico, Ratto grigio e Ratto nero. Posizionare 60-100 g di RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 grammi ciascuno oppure pari a 6-10 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 10 g ciascuno. Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al massimo ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente. Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti. Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'. In caso di utilizzo di "permanent baiting": il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di re-infestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti. La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione.

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni riportate sull'imballo del prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita. Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione. Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca. Il prodotto deve essere usato unicamente nell'ambito del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo. Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tutte le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di re-infestazione. I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.). Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture. I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti. Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento. L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche. Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio. Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto. Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche (UNI EN374 PF>4). Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto. La frequenza delle visite all'area trattata è a discrezione dell'operatore, alla luce del sopralluogo condotto all'inizio del trattamento. La frequenza deve essere conforme alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti. Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca. Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determinarne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo. Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori con le esche.

Confezioni di vendita:

scatola 10 kg

Informazioni per lo smaltimento:

Riciclamo insieme

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Scatola	Cartone	PAP 20	Raccolta carta
Busta	Plastica	LDPE 4	Raccolta plastica

NOTE AGGIUNTIVE

L'imballaggio contiene un rodenticida, prima di procedere con la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune.

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE**Note:**

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.



Revisione: 2025

Scheda Tecnica

RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS

"Difesa dai roditori"

Rodenticidi

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.



Thinking Forward

Revisione: 2025

Scheda Tecnica

RATACUM™ BLOCCO PARAFFINATO PLUS

"Difesa dai roditori"

Rodenticidi