



RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS 10kg

Codice prodotto: 2538243AP

Categoria: Biocida

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di pasta USO PROFESSIONALE CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI FORMATI AREA DI UTILIZZO ALL' INTERNO, ALL'ESTERNO INTORNO AGLI EDIFICI ed AREE APERTE

Registrazione Ministeriale:

IT/2013/00127/AUT

Composizione:

100 grammi di prodotto contengono:

Bromadiolone (N°CAS 28772-56-7): 0,005g

Denatonio Benzoato (N°CAS 3734-33-6): 0,001g

Caratteristiche:

RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Bromadiolone, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori. RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini. RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS può essere usata all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, in giardini ed in aree aperte all'esterno.

ORGANISMI TARGET Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti, Ratto nero (*Rattus rattus*), sia giovani che adulti.

MODALITÀ APPLICATIVE RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS è un'esca pronta all'uso in forma di pasta, da utilizzare in contenitori per esche a prova di manomissione o in punti esca coperti e protetti dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

Aroma: salmone

Modalità d'impiego:

Utilizzare il prodotto conformemente ai dosaggi sotto riportati. Per l'applicazione in punti esca coperti e protetti, i punti esca

devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio. Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia. Raccogliere il prodotto rimanente alla fine del periodo di trattamento. Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti. Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti. In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua. Non applicare il prodotto direttamente nelle tane. Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento se non utilizzato come esca permanente.

Uso all'interno di edifici per il controllo del Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero. Topolino domestico: – posizionare 40 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 2 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. Ratto grigio e Ratto nero: – in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. – in caso di bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 2-3 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuna.

Uso all'esterno, intorno agli edifici per il controllo del Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero. Topolino domestico: – posizionare 40 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 2 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. Ratto grigio e Ratto nero: – in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. – In caso di bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 2-3 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. Uso all'esterno, in aree aperte, per il controllo di Ratto grigio e Ratto nero. – in caso di alta infestazione: posizionare 60-100 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. – in caso di bassa infestazione: posizionare 40-60 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 2-3 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuna. Uso come esca permanente per il controllo del Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero. Posizionare 60-100 g di RATADIOL™ PASTA FRESCA PLUS per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta pronte all'uso da 20 grammi ciascuno. Ove possibile, si raccomanda di rivisitare l'area trattata al massimo ogni 4 settimane al fine di evitare la possibile selezione di una popolazione resistente. Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti. Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'. In caso di utilizzo di 'permanent baiting': il trattamento con la tecnica di 'permanent baiting' è strettamente limitato a quei luoghi con alto potenziale di re-infestazione qualora altri metodi di controllo si siano dimostrati insufficienti. La strategia di 'permanent baiting' deve essere rivalutata periodicamente nel contesto di una strategia di Gestione Integrata delle Infestazioni (IPM) e della valutazione del rischio di una possibile re-infestazione.

Tipologia di utilizzo:

Professionale

Avvertenze:

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine. Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario. In caso di: Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone. Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti. Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito. In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in

caso d'ingestione da parte di un animale domestico. I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni: "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza (e) attiva (e)" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni." Pericoloso per la fauna selvatica.

Confezioni di vendita:

Scatola 10kg

Informazioni per lo smaltimento:**Riciclamo insieme**

Componente	Materiale		Informazioni aggiuntive
Scatola Busta	CARTONE PLASTICA	PAP 20 LDPE 4	Raccolta Carta Il prodotto contiene un rodenticida, prima di procedere con la raccolta differenziata verifica le disposizioni del tuo comune

CONSULTA LE INDICAZIONI DEL TUO COMUNE**Note:**

Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Si richiama l'attenzione sulle frasi e sui simboli di pericolo riportati in etichetta.

Il testo riportato nella scheda corrisponde all'etichetta approvata dal Ministero della Salute.

03/01/2019