

MAGNUM GEL FORMICHE

Prodotto Biocida (PT18) - Autorizzazione Ministero della Salute N.IT/2017/00442/MRP
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

Composizione

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| 100 g di prodotto contengono: | |
| Imidacloprid (CAS n. 138261-41-3) | 0,01% |
| Bitrex® (Denatonium benzoato) | 0,008% |
| Coformulanti | q.b. a 100% |

Formulazione

Insetticida pronto all'uso (RTU) in formulazione gel, agisce per ingestione. Il prodotto contiene denatonium benzoato, sostanza estremamente amara che rende improbabile l'ingestione involontaria da parte dei bambini. MAGNUM GEL FORMICHE ha un effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, per consentire alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui presenti del nido, comprese regine e larve, attraverso il particolare fenomeno detto Trofallassi, che prevede la condivisione di cibo tra individui della stessa colonia.

Infestanti bersaglio

MAGNUM GEL FORMICHE è un insetticida efficace contro formiche comuni e tropicali, tra le quali formica nera (*Lasius niger*), formica argentina (*Linepithema humile*) e formica faraone (*Monomorium pharaonis*).

Ambienti d'uso

Il prodotto può essere utilizzato in interni (abitazioni private e/o edifici pubblici, di carattere residenziale, commerciale, industriale) e in esterni (perimetro di edifici, terrazze e giardini privati).

Attrezzature

- Pistola erogatrice
- Distributori di esca

Dosi consigliate e consigli di utilizzo

MAGNUM GEL FORMICHE deve essere posizionato in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche.

Dose: 0.2 g/m² (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza).

Leggere attentamente l'etichetta prima dell'uso. Il gel deve essere applicato nelle aree in cui le formiche sono presenti, in prossimità dei nidi, presso i loro percorsi o in crepe e fessure. Per utilizzo in esterni (terrazze, patii, cortili o giardini), il prodotto va applicato nelle aree di maggiore presenza delle formiche: davanzali, battiscopa, cornicioni e nei punti di entrata di cavi e tubature. L'area da trattare deve essere accuratamente ispezionata per determinare l'estensione dell'infestazione. Rimuovere dalle aree limitrofe eventuali fonti alimentari alternative raggiungibili dalle formiche. Non contaminare il gel con insetticidi tradizionali, non applicare su superfici trattate con insetticidi tradizionali da meno di 3-4 settimane.

Indicazioni di pericolo

H410 Molto tossico per organismi acquatici con effetti di lunga durata.



Sfoggia il catalogo

Codice scheda - CA_2024_14_rev00

Note

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati in etichetta. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. Prima dell'uso, provare il prodotto su un'area ridotta della superficie da trattare. Non miscelare con altri insetticidi e/o disinfettanti e/o detersivi. Conservare ben chiuso in un luogo sicuro, asciutto e ben ventilato. Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. In caso di irritazione, consultare un medico, tenendo a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e - in generale - ai laureati in discipline scientifiche.

INDIA è un brand di Indupharma S.r.l.

via Sorgaglia, 40 \ 35020 Arre (PD), Italy
tel. + 39 049 531 04 15 \ 39 049 807 61 44
info@indupharma.eu - www.indupharma.eu