

# MEGALON® FIOCCATO

Prodotto Biocida (PT14) - Autorizzazione Ministero Della Salute N. IT/2014/00250/AUT  
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e approvato dal Ministero della Salute, prima dell'utilizzo leggere attentamente l'etichetta del prodotto.

## Composizione

100 g di prodotto contengono:

Bromadiolone	0,005 g
Denatonio benzoato	0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti	q.b. a 100 g

## Formulazione

Esca topicida-ratticida pronta all'uso in granaglia, colore rosso.

## Infestanti bersaglio

*Rattus norvegicus* (ratto grigio), *Rattus rattus* (ratto nero dei tetti), *Mus musculus* (topolino domestico); risulta essere particolarmente appetibile per i roditori abituati a nutrirsi di granaglie.

## Ambienti d'uso

MEGALON® FIOCCATO può essere impiegato per derattizzazioni all'interno ed intorno ad ogni ambiente domestico, civile, industriale (case, uffici, comunità, industrie, depositi merci, mezzi navali ecc.), rurale (allevamenti, case di campagna ecc.) e anche in campo aperto (giardini, viali, parchi ecc.).

- Uso interno per topi e ratti
- Uso esterno intono edifici per topi e ratti
- Uso esterno aree aperte e discariche
- Uso fognature

## Attrezzature

L'esca rodenticida deve essere inserita in un contenitore appropriato, protetta dagli agenti atmosferici e dalla dispersione nell'ambiente. I contenitori devono essere disposti in modo da minimizzare il rischio di ingestione involontaria da parte di bambini o animali non bersaglio e posti in luoghi a loro inaccessibili. Il contenitore deve essere ancorato adeguatamente e avere l'accesso previsto solo per l'animale bersaglio.

## Dosi consigliate

Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero:

- Basse infestazioni: 40–60 g di esca per punto esca.
- Elevate infestazioni: 60–100 g di esca per punto esca.

Uso come esca permanente per il controllo di Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero:

- 60–100 g di esca per punto esca.

Controllare i punti esca almeno ogni 4 settimane per evitare il rischio di creare popolazioni resistenti.

## Consigli di utilizzo

Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare dei punti-esca nei pressi delle tane dei roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di maggior frequentazione con una quantità di prodotto secondo i dosaggi indicati.

Segnalare la zona interessata dal trattamento indicando il rischio di avvelenamento e le misure primo soccorso.

Programmare ispezioni periodiche, rilevare il consumo di esche e ricollocarne se consumate. Utilizzare guanti appropriati per manipolare il prodotto.

## Indicazioni di pericolo

**H360D** Può nuocere al feto.

**H372** Provoca danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.



**Antidoto: Vitamina K1**

### Note

Non utilizzare per usi diversi da quelli indicati in etichetta. Il produttore non assume responsabilità alcuna nei confronti di terzi, chi utilizza il prodotto è responsabile per eventuali danni derivanti dal suo impiego. Conservare ben chiuso in un luogo sicuro, asciutto e ben ventilato. Assicurarsi che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata dei bambini, dei ragazzi e degli animali da compagnia. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti ad essi destinati. Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. In caso di irritazione, consultare un medico, tenendo a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Pubblicazione riservata alle seguenti categorie professionali: agronomi, disinfestatori professionali, igienisti, medici, biologi, parassitologi, veterinari e – in generale – ai laureati in discipline scientifiche.



Sfoggia il catalogo

Codice scheda - ER\_2024\_02\_rev00

**INDIA è un brand di Indupharma S.r.l.**

via Sorgaglia, 40 \ 35020 Arre (PD), Italy  
tel. + 39 049 531 04 15 \ 39 049 807 61 44  
info@indupharma.eu - www.indupharma.eu