

Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



INSETTICI E ACARICIDI

ALFASECT

INSETTICIDA-ACARICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA - USO PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE

La sostanza attiva Alfa-cipermetrina, appartenente alla famiglia chimica dei piretroidi, è un insetticida-acaricida non-sistemico ad azione per contatto ed ingestione. Agisce sul sistema nervoso centrale e periferico a bassissime dosi.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Alfasect idoneo per trattamenti insetticidi dei seguenti ambienti: locali domestici, edifici pubblici inclusi ospedali, alberghi e ristoranti, cucine, impianti dell'industria alimentare, stalle, ricoveri di animali, pollai. Il prodotto può essere impiegato in aree costantemente occupate solo per trattamenti localizzati o su crepe o fessure.

REGISTRAZIONE N. 20160 – ALFASECT
– TITOLARE DELLA REGISTRAZIONE : SHARDA
Europe b.v.b.a. – Jozef Mertensstraat 142 – 1702
Dilbeek – Belgio

PMC

INFESTANTI TARGET

Insetti volanti (mosche, zanzare) – Insetti striscianti (scarafaggi, formiche, cimici dei letti) – Acaro rosso dei polli, zecche.

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Dose normale: Per trattamenti di routine contro insetti volanti e striscianti, acaro rosso dei polli e zecche diluire 25 mL di prodotto in 5 litri d'acqua, quindi applicare 1 litro della soluzione ottenuta per 20 m² di superficie.

Dose particolare: Per uso in cui sia necessaria una forte azione residuale o su superfici sporche o particolarmente assorbenti diluire 50 mL di prodotto in 5 litri d'acqua, quindi applicare 1 litro della soluzione ottenuta per 20 m² di superficie.

Applicare utilizzando normali pompe a mano o a motore, equipaggiate per produrre spray a gocce grosse. Aggiungere il quantitativo appropriato di ALFASECT al volume richiesto di acqua pulita ed agitare. Applicare sulle superfici frequentate dagli insetti, in particolare crepe, fessure, dietro mobili o attrezzature.

Insetti volanti: applicare sulle superfici in cui gli insetti si fermano.

Scarafaggi e altri insetti striscianti: spruzzare intorno ai condotti di servizio, dietro e sotto arredi, letti ed attrezzature. Se gli insetti entrano dall'esterno, spruzzare creando una barriera di 10 cm di larghezza davanti a porte, finestre, ecc.

Scarafaggio nero (*Alphitobius diaperinus*): applicare come trattamento di routine dopo la pulizia e prima di ogni nuovo ciclo. Spruzzare su tutte le superfici verticali, ad es. pareti, divisori, postazioni ed assicurare una sovrapposizione al soffitto. Non necessario trattare i pavimenti.

Acaro rosso dei polli (*Dermanissus gallinae*): applicare alla dose normale all'inizio del ciclo, prima che i pulcini siano immessi nel pollaio. Spruzzare l'intera superficie di gabbie, nidi, voliere e pavimenti se del caso. Prestare particolare attenzione ad angoli, fessure e crepe dove gli acari possono annidarsi. Non spruzzare direttamente sui polli quando viene utilizzato durante il ciclo colturale.

Zecche: spruzzare intorno ai luoghi di ricovero degli animali, nelle cucce e nelle gabbie dei canili.

COMPOSIZIONE

Alfa-cipermetrina pura (CAS n. 67375-30-8) 5.68%