


Soluzioni specifiche per i professionisti del futuro



Difeso Biocida (prossima registrazione) –
REGISTRAZIONE N. 19590

PMC

INSETTICI E ACARICIDI

BLUCYP® DP

INSETTICIDA PIRETROIDE AD AMPIO SPETTRO PER IL CONTROLLO DEGLI INSETTI STRISCANTI E DEI NIDI DI FORMICHE E VESPE

CARATTERISTICHE

BLUCYP DP è un insetticida piretroide in polvere fine, attivo per contatto ed ingestione, privo di odore, da utilizzare tal quale o diluito in acqua. **BLUCYP DP** è indicato per fronteggiare rapidamente ed in maniera persistente le infestazioni da insetti striscanti come scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, cimici, scarabei, e per il trattamento dei nidi di vespe.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Il prodotto può essere impiegato, nelle modalità di seguito descritte, in tutti gli ambienti domestici e civili quali abitazioni, scuole, cinema, teatri, mense, uffici, sale di attesa di: aeroporti, stazioni, ospedali; fabbriche, magazzini, alberghi, ristoranti edifici rurali, stalle, fattorie, stive di navi e di aerei, vagoni ferroviari, bagni pubblici, garage, canili, cestelli, cucce, cucine industriali, ripostigli. Può essere applicato sia su superfici rigide che superfici morbide.

INSETTI TARGET

Insetti striscanti come scarafaggi, formiche, pesciolini d'argento, cimici, scarabei, e nidi di vespe

COMPOSIZIONE

Cipermetrina pura (CAS n. 52315-07-8) : 0,25%

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicare **BLUCYP DP** con le seguenti modalità:

Per uso all'interno di locali: impiegare il prodotto tal quale alla dose di circa 10 g/m² in crepe e fessure, dietro il mobilio e gli elettrodomestici, lungo i battiscopa, sotto lavandini, divani, tappeti e cucce. Ripetere l'applicazione in caso di necessità.

Per uso all'esterno: impiegare il prodotto tal quale alla dose di circa 10 g/m² nelle aree intorno ai ricoveri di bestiame, marciapiedi, garage, contenitori dei rifiuti ed in generale in tutti i luoghi in cui gli insetti possono annidarsi. Il prodotto può essere distribuito anche per irrorazione delle superfici alla dose di 25-50 g diluiti in 5 litri d'acqua, in relazione alla gravità dell'infestazione.

Nidi di formiche: impiegare il prodotto tal quale all'entrata del nido. Ripetere il trattamento in caso di necessità. Il prodotto può essere distribuito anche per irrorare il nido alla dose di 25-50 g diluiti in 5 litri d'acqua, in relazione alla gravità dell'infestazione.

Nidi di vespe: impiegare il prodotto tal quale intorno al nido. Effettuare i trattamenti solo nelle prime ore della sera.

PZ/CARTONE

FLACONE 500 g x 12 pz

BUSTA 1 kg x 12 pz

FLACONE 250 g x 24 pz