INSETTICI E ACARICIDI

IMPACT GEL FORMICHE

MATRICE ALIMENTARE ALTAMENTE APPETIBILE

CARATTERISTICHE

L'esca ha un'eccellente palatabilità e grazie al suo effetto ritardato, che si manifesta dopo alcune ore dall'ingestione, consente alle formiche operaie di trasferire il prodotto agli altri individui della colonia. Il prodotto contiene un amaricante (Denatonio benzoato).

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ambienti Civili, Aree Verdi, Ho.re.ca., Industria, Industria Alimentare, Mezzi di trasporto, Ospedali

Simbologia di pericolo: GHS09 Aut. Biocida: IT/2017/00442/MRP

Biocida

INFESTANTI TARGET

Formiche comuni
e tropicali

COMPOSIZIONE

Imidacloprid puro: 0,01%

DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO

Applicare il gel posizionandolo in piccole gocce o in alternativa formando sottili linee nei pressi dei nidi o dei percorsi tracciati dalle formiche.
Utilizzare 0,2 g/m^2 (corrispondenti a una goccia / una linea sottile di 3 cm di lunghezza).
Dopo 7 giorni dall'applicazione, ispezionare e ricollocare l'esca se consumata. Il trattamento può essere ripetuto dopo tre mesi dal termine del precedente.

PZ/CARTONE

4 SIRINGHE 35 g x 14 pz
STANTUFFI x 15 pz
CONTENITORE
PER ESCA MINI bianco x 50 pz

Newpharm s.r.l. - Via Tremarende 22, 35010 Santa Giustina in Colle (PD) - Italy
Tale pubblicazione è strettamente riservata alla forza vendita, ai rivenditori ed ai tecnici specializzati. Le informazioni ivi riportate sono a carattere puramente informativo. L'utilizzatore deve pertanto leggere attentamente quanto riportato sulla confezione ed attenersi alle indicazioni presenti sull'etichetta dei singoli prodotti per il loro corretto utilizzo e per evitare danni a piante, persone ed animali. Newpharm S.r.l. declina ogni responsabilità per l'uso improprio dei prodotti o nel caso in cui gli stessi venissero impiegati in violazione di qualsiasi norma.